

การป้องกัน


สำหรับหน่วยงาน

- ปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
- โรงพยาบาลควรให้การดูแลผู้ที่ถูกสุนัขกัดตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย




สำหรับประชาชน

- ป้องกันสุนัขกัดโดยเฉพาะในเด็กอายุ 1-10 ขวบ
- ให้ใช้ค่าตา 5 ข. อย่าเหยย อย่าเหยียบ อย่าเหยียบ อย่าขู่ กับสุนัข หรือแมว รวมถึงอย่าปล่อยให้เด็กอยู่กับสุนัขตามลำพัง
- หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่เลี้ยง
- การเข้าหา เล่นกับสุนัขอย่าทำให้สุนัขเจ็บ หรือโกรธ หรือตกใจ
- เมื่อถูกสุนัข (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ) กัด ข่วน ต้องรีบล้างแผล ใส่ยา และกักสุนัขไว้เป็นเวลา 10 วัน ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องได้รับวัคซีนและอิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่
- พบสุนัขไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือสงสัยว่าผิดปกติ แจ้งปศุสัตว์ หรือ อบต./เทศบาล



โรคพิษสุนัขบ้า



รักแมว รักหมา

พากันไปฉีดยาพิษสุนัขบ้า

รักบ้าน รักชุมชน ไม่สนับสนุนสุนัขจรจัด

การระบาด

โรคนีเกิดจาก เชื้อไวรัส Rabies ซึ่งมี
แหล่งรังโรคได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญ
ได้แก่ สุนัข พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ติดเชื้อจากการถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดข่วน
รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัข
บ้าพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด ในภาคกลาง รองลงมา
เป็นภาคใต้ พบได้ทุกเพศ ทุกวัย


กลุ่มเสี่ยง

- คนที่ชอบเลี้ยงสุนัขหรือเล่นกับสุนัขที่ไม่
ทราบประวัติการฉีดวัคซีน
- คนที่ถูกสุนัขหรือแมวกัด แล้วสัตว์ที่กัด
ตายใน 10 วันหลังกัด หรือสัตว์ที่กัดมี
ประวัติกัดคนหรือสัตว์อื่นด้วยในเวลา
ใกล้เคียงกัน
- เด็กอายุ 1-10 ปี เสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัด
และไม่ได้บอกผู้ปกครอง

พื้นที่เสี่ยง

ได้แก่พื้นที่ที่มีลักษณะต่อไปนี้

- มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษพิษสุนัขบ้าในระยะ
5 ปี ที่ผ่านมา
- ตรวจพบโรคพิษพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระยะ 5
ปีที่ผ่านมา
- มีคนถูกสุนัขกัดจำนวนมาก
- สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าต่ำกว่าร้อยละ 70
- มีจำนวนสุนัขจรจัดอยู่หนาแน่น



อาการ

อาการของโรคในคน

จำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ

- แบบคลุ้มคลั่ง ต้องมีอาการครบ 3
ประการ คือ
1.1 อาการสลับเปลี่ยนระหว่าง
ภาวะการรับรู้ตัวเป็นปกติ และไม่รู้ตัว
ตื่นเต้น กระวนกระวายต่อสิ่งเร้า
1.2 อาการกลัวน้ำ หรือกลัวลม
1.3 ขนลุก รูม่านตาไม่ตอบสนองต่อ
แสง และมีอาการคัน ปวดแสบปวด
ร้อนแพร่กระจายทั่วแขนขา
- แบบอัมพาต หรือแขน ขาอ่อนแรง
เมื่ออาการมากขึ้น จะหายใจมา
สะดวก หดความรู้สึก และเสียชีวิต
ในที่สุด
- แบบอาการไม่ชัดเจน